


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

TD/BS ngày 20 tháng 8 năm 2018
(theo công văn 16322/QLD-ĐK)

NATRI CLORID 3%

Thùng 20 chai 500 ml



Thuốc kê đơn/ Prescription Drug

500 ml

Thùng 20 chai 500 ml

Natri Clorid 3%

Dung dịch tiêm truyền/ Solution for infusion

TTTM/ I.V.

SDK/Reg. No.:

GMP WHO

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thành phần: 500 ml dung dịch chứa:
Natri clorid 15 g

Tiêu chuẩn chất lượng: BP

Bảo quản: Ở nhiệt độ không quá 30°C. Tránh ánh sáng.

LSX/LOT:

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

NSX/MFG:

HD/EXP:

Cơ sở sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar
Khu vực 8, P. Nhơn Phú, Tp. Thủ Đức, Bình Định, Việt Nam



FRESENIUS
KABI
BIDIPHAR

Thùng 80 chai 100 ml



Thuốc kê đơn/ Prescription Drug

100 ml

Thùng 80 chai 100 ml

Natri Clorid 3%

Dung dịch tiêm truyền/ Solution for infusion

TTTM/ I.V.

SDK/Reg. No.:

GMP WHO

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thành phần: 100 ml dung dịch chứa:
Natri clorid 3 g

Tiêu chuẩn chất lượng: BP

Bảo quản: Ở nhiệt độ không quá 30°C. Tránh ánh sáng.

LSX/LOT:

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

NSX/MFG:

HD/EXP:

Cơ sở sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar
Khu vực 8, P. Nhơn Phú, Tp. Thủ Đức, Bình Định, Việt Nam



FRESENIUS
KABI
BIDIPHAR

150 x 60 mm
13PM-04Jul2018

C11M20

M100Y100

C100Y100

458/157

Thuốc tiêm truyền
NATRI CLORID 3%

*** Thành phần:**

Thành phần	Hàm lượng	
	Chai 100 mL	Chai 500 mL
Natri clorid	3 g	15 g
Nước cất pha tiêm vô	100 mL	500 mL

*** Dạng bào chế:** Dung dịch tiêm truyền*** Qui cách đóng gói:** Chai 100 mL, chai 500 mL*** Được lực học:**

- Natri là cation chính của dịch ngoại bào, Clorid là anion chính của dịch ngoại bào, có chức năng chủ yếu trong điều hòa sự phân bố nước, cân bằng nước, điện giải và áp suất thẩm thấu của dịch cơ thể.
- Natri kết hợp với Clorid và bicarbonat trong điều hòa cân bằng kiềm - toan, được thể hiện bằng sự thay đổi nồng độ clorid trong huyết thanh.

*** Được động học:**

- Hấp thu nhanh bằng đường tiêm truyền tĩnh mạch. Thuốc được phân bố rộng rãi trong cơ thể. Thải trừ chủ yếu qua nước tiểu, nhưng cũng được thải trừ qua mồ hôi, nước mắt và nước bọt.

*** Chỉ định:**

- Dung dịch natri ưu trương 3% dùng cho trường hợp thiếu hụt natri clorid nghiêm trọng cần phục hồi điện giải nhanh; (thiếu hụt natri clorid nghiêm trọng có thể xảy ra khi có suy tim hoặc giảm chức năng thận, hoặc trong khi phẫu thuật hoặc sau phẫu thuật).
- Còn được dùng khi giảm natri và clorid huyết do dùng dịch không có natri trong nước và điện giải trị liệu, và khi xử lý trường hợp dịch ngoại bào pha loãng quá mức sau khi dùng quá nhiều nước (thụt hoặc truyền dịch tưới rửa nhiều lần vào trong các xoang tĩnh mạch mở khi cắt bỏ tuyến tiền liệt qua niệu đạo).

*** Liều dùng, cách dùng:**


- Tiêm truyền nhỏ giọt tĩnh mạch lớn, không được để thuốc thoát mạch.
- Liều thông thường ban đầu tiêm tĩnh mạch là 100 mL tiêm trong 1 giờ, trước khi tiêm thêm, cần phải định lượng nồng độ điện giải trong huyết thanh bao gồm cả clorid và bicarbonat, tiêm truyền tĩnh mạch không được vượt quá 100 mL/giờ.
- Dung dịch ưu trương đậm đặc cần thận trọng khi sử dụng, cần theo dõi điện giải đồ trong quá trình điều trị.

*** Chống chỉ định:**

- Người bệnh trong tình trạng dùng natri và clorid sẽ có hại: Người bệnh bị tăng natri huyết, bị ứ dịch.
- Chống chỉ định khi nồng độ điện giải huyết thanh tăng, bình thường hoặc chỉ giảm nhẹ.

*** Thận trọng:**

- Hết sức thận trọng với người bệnh suy tim xung huyết hoặc các tình trạng giữ natri hoặc phù khác
- Người bệnh suy thận nặng, xơ gan, đang dùng các thuốc corticosteroid hoặc corticotropin.
- Đặc biệt thận trọng với người bệnh cao tuổi và sau phẫu thuật.



TU QU CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Thu Thủy

*** Tương tác thuốc:**

- Thừa natri làm tăng bài tiết lithi; thiếu natri có thể thúc đẩy lithi bị giữ lại và tăng nguy cơ gây độc; người bệnh dùng lithi không được ăn nhạt.
- Nước muối ưu trương dùng đồng thời với oxytocin có thể gây tăng trương lực tử cung, có thể gây vỡ tử cung hoặc rách cổ tử cung. Cần theo dõi khi dùng đồng thời.

*** Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:**

- Thuốc an toàn cho người mang thai và không ảnh hưởng đến việc cho con bú

*** Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy:**

- Không ảnh hưởng khi lái xe và vận hành máy móc

*** Tác dụng không mong muốn:**

- Hầu hết các phản ứng phụ có thể xảy ra sau khi tiêm do dung dịch nhiễm khuẩn hoặc do kỹ thuật tiêm. Khi dùng các chế phẩm không tinh khiết có thể gây sốt, nhiễm khuẩn ở chỗ tiêm và thoát mạch. Tăng thể tích máu hoặc triệu chứng do quá thừa hoặc thiếu hụt một hoặc nhiều ion trong dung dịch cũng có thể xảy ra.
- Dùng quá nhiều natri clorid có thể làm tăng natri huyết và lượng clorid nhiều có thể gây mất bicarbonat kèm theo tác dụng toan hóa.

**Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn
gặp phải khi sử dụng thuốc**

*** Quá liều và cách xử trí:**

- Triệu chứng: Buồn nôn, nôn, tiêu chảy, co cứng bụng, khát, giảm nước mắt và nước bọt, hạ kali huyết, tăng natri huyết, vã mồ hôi, sốt cao, tim nhanh, tăng huyết áp, suy thận, phù ngoại biên và phù phổi, ngừng thở, nhức đầu, hoa mắt, co giật, hôn mê và tử vong.
- Điều trị: Khi có tăng natri huyết, nồng độ natri phải được điều chỉnh từ từ với tốc độ không vượt quá 10 - 12 mmol/lít hàng ngày. Tiêm truyền tĩnh mạch các dung dịch natri clorid nhược trương và đẳng trương (nhược trương đối với người bệnh ưu trương); khi thận bị thương tổn nặng, cần thiết, có thể thẩm phân.

*** Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng thuốc quá hạn dùng

Nếu quan sát thấy dung dịch vẫn đục thì không được sử dụng.

*** Bảo quản:** Tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ
THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ

Sản xuất tại:

CÔNG TY CP FRESENIUS KABI BIDIPHAR
Khu vực 8, Phường Nhơn Phú, Tp. Thủ Đức, Tỉnh Bình Định
Việt Nam
Tel: 056.2210641 * Fax: 056.2220498

